

Mionochroma rufescens (Gahan, 1895)

Famille des *Cerambycidae*



Répartition

Mionochroma rufescens se rencontre dans les Petites Antilles, notamment à Sainte-Lucie et en Martinique où l'espèce occupe les sous-bois et les forêts de la partie Nord de l'île, avec des observations à Sainte-Marie (Vaillant et Bonfils, 1965), à Absalon (Ravine Clark, 1996) et sur la Trace Nord (David, 2008), sur la route de la Trace et sur le sentier Prêcheur-Grand Rivière (F. Deknuydt).



Imago, Absalon, Martinique



Identification

Ce longicorne aux reflets métalliques verts peut atteindre trois centimètres de longueur. Tête et pronotum sont nettement métalliques. Les élytres sont bruns et marqués de larges bandes grisâtres, les fémurs sont rouges et les tibias noirs.



Imago, Absalon, Martinique



Ecologie

L'espèce est rare et son écologie encore insuffisamment connue. Les imagos de cette espèce diurne peuvent se rencontrer tout au long de l'année. Les imagos s'observent parfois en nombre : ainsi, sur la Trace Nord à Absalon, nous avons vu trois spécimens actifs de tailles très variables en moins d'une heure. Aussi, plusieurs imagos ont été vus sur le même tronc (F. Deknuydt). La larve se rencontre dans le balata rouge (*Pouteria pallida*).



Références

Chalumeau F. et Tourout J. 2005 [2006]. *Les Cerambycidae des Petites Antilles. Taxonomie, éthologie, biogéographie*. Pensoft Series Faunistica N°51. Pensoft Publisher, Sofia-Moscow. 274p. ISBN 9546422452.

Regarder d'abord chez l'imago

- Teinte générale vert métallique
- Bandes brunes et grises
- Fémurs rouges

