

# *Taeniotes leucogrammus*

Thomson, 1865

Famille des *Cerambycidae*



## Répartition

*Taeniotes leucogrammus* est endémique de Sainte-Lucie et de Martinique. Peu commun, il a été observé en Martinique au Didier, au Prêcheur, au Gros-Morne, à Schoelcher, à Colson et un spécimen est conservé dans la collection Roguet (avril 1961, J. Pierre). Nous l'avons observé en décembre 2007 à Absalon et au Morne Rouge.



Imago, Absalon, Martinique



## Identification

Ce longicorne peut atteindre quatre centimètres de longueur. Il se caractérise par de longues antennes (le double de la longueur du corps chez le mâle) et de belles bandes longitudinales sur les élytres et le pronotum. Le reste du corps est brun, parfois prune.



## Regarder d'abord

chez l'imago

- Teinte générale brun-violet
- Bandes blanches aux élytres
- Antennes très longues



Imago, Absalon, Martinique



## Ecologie

L'espèce est peu commune et son écologie reste insuffisamment connue. *Taeniotes leucogrammus* se rencontre dans les forêts de la partie Nord de la Martinique, de Schoelcher à une plus importante altitude puisque nous avons observé deux exemplaires venus à la lumière d'une maison en décembre 2007, sur les hauteurs de Morne-Rouge. La larve de cette espèce n'est pas précisément connue. Le spécimen illustré ici, dont les antennes sont sectionnées, a été rencontré de jour, sur les rochers au milieu d'une rivière d'altitude.



## Références

Chalumeau F. et Touroult J. 2005 [2006]. *Les Cerambycidae des Petites Antilles. Taxonomie, éthologie, biogéographie*. Pensoft Series Faunistica N°51. Pensoft Publisher, Sofia-Moscow. 274p. ISBN 9546422452.