

Leptotes cassius

Cramer, 1775

Angl. Cassius blue - **Fr.** Azuré fleur / Argus gris clair
Famille des *Lycaenidae*

Répartition

Leptotes cassius se rencontre de la Floride au Texas, ainsi que dans les Antilles, au moins jusqu'à Sainte Lucie vers le sud. En Martinique et en Guadeloupe, certains auteurs envisagent la sous-espèce *L. cassius chadwicki*.

Assez commune en Martinique, l'espèce occupe presque tous les étages, de la zone littorale aux alentours des Pitons du Carbet.

Le papillon se pose ailes refermées sur les tiges et le dessus des feuilles.



Imago, Trois-Ilets, Martinique

Identification



Imago, Trois-Ilets, Martinique

Cette lycène de taille moyenne est assez facilement identifiable : le dessus des ailes du mâle est bleuâtre tandis que celui de la femelle est à dominante claire, bordé d'une large bande brune. Une alternance de lignes courbes et de motifs bruns et blancs compose le dessous des ailes. Deux lunules s'observent au-dessous des ailes postérieures, noires constellées d'écaillles bleues métallisées, entourées à leur tour d'un fin liseré jaune.

La chenille est verte, parcourue d'une bande dorsale blanchâtre et d'une ligne latérale blanche.

La chrysalide est plus ou moins claire, maculée de taches brunes.

Regarder d'abord

chez le papillon

- Une teinte grisâtre
- Quatre petites queues
- Un point noir entouré de rouge
- Une ligne blanche au dessus

Regarder d'abord

chez la chenille

- Une teinte verte
- Une bande dorsale blanchâtre
- Une bande latérale blanche

Habitat et Plantes hôtes

Le papillon est assez commun dans le nord, en milieu d'altitude où l'humidité est moyenne. Il occupe ainsi les bords de routes forestières, les traces parfois venteuses et les jardins. On le rencontre aussi dans le sud et dans le centre, en milieux plus secs. De petites populations localisées fréquentent les traces et les chemins des mornes du Massif du Sud-Ouest, les carrières et les friches urbaines, parfois en proche bordure littorale.

Plusieurs plantes hôtes de la famille des Fabacées sont mentionnées de Martinique : *Phaseolus lunatus*, *Crotalaria incana*, *Gliricidia sepium* et *Cajanus cajan*.

Références

- Brevignon L. et Brevignon C., 2003. *A la découverte des papillons des Antilles*. PLB éditions, 64p
- Pinchon R. & Enrico P., 1969. *Faune des Antilles françaises, les papillons*. Fort de France, 258p.
- Sastre C. et Breuil A., 2007. *Plantes, milieux et paysages des Antilles françaises*. Biotope, collection Parthenope, 672p.
- Smith D., Miller L. & Miller J., 1994. *The butterflies of the West Indies and South Florida*. Oxford University press. 346p.

Textes et photographies : Gwénael DAVID et Bénédicte THIEBAUT